

KEBENE Pro Baby picături orale

Suspensie pentru tulburări funcționale gastrointestinale



KEBENE Pro Baby suspensie instant este un produs constituit din:

- 1 sticlă de 20 ml cu picurător cu pompă care conține o emulsie de Simeticonă în soluție apoasă.
- Conservanți: benzoat de sodiu; Îndulcitori: zaharină sodică; aromă de căpșuni.
- 1 plic cu 2 g de Saccharomyces Boulardii, maltodextrine.

Indicații terapeutice:

KEBENE Pro Baby este un dispozitiv medical indicat în caz de: tulburări dispeptice, meteorism gastrointestinal, aerofagie și colici gazoase la sugari, copii și adulți.

Ca urmare a asocierii dintre simeticonă (ingredient activ) și probioticul (adjuvant activ), KEBENE Pro Baby suspensie instant are rolul de a proteja și regenera bariera biologică intestinală (flora intestinală) și în același timp de a reduce tensiunea superficială a bulelor de aer gastric pentru a ajuta la eliminarea simptomelor menționate mai sus.

Activitatea principală este exercitată de Simeticonă (metilpolisiloxan activat), polimer chimic inert al metilsiloxanului. Proprietatea chimico-fizică a simeticonei este de a reduce tensiunea superficială, astfel încât bulele de gaz din tractul intestinal să se unească formând gaz liber, care este ușor de eliminat. Ameliorează așadar toate simptomele supărătoare (durerea, crampele, senzația de tensiune, eructațiile, flatulența), legate de balonare, caracteristice multor boli ale tractului gastro-intestinal.

Această activitate este susținută de Saccharomyces boulardii care acționează ca o floră temporară, protejând sistemul intestinal și permițându-i să funcționeze corespunzător prin restabilirea microflorei. Când întrerupeți tratamentul, această componentă este eliminată în decurs de câteva zile.

Posologie și mod de administrare

Doză unică: 20 picături care conțin 40 mg de Simeticonă.

Adulți: 20-40 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 2-4 ori pe zi sau în funcție de sfatul medicului.

Copii: 20 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 1-3 ori pe zi sau în funcție de sfatul medicului.

Sugari: 20 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 1-2 ori pe zi sau în funcție de sfatul medicului.

Instrucțiuni de utilizare

Suspensie instant: pentru a asigura stabilitatea și calitatea maximă a produsului, Saccharomyces boulardii pudră este păstrată într-un mediu protejat în plic și se diluează în lichidul de simeticonă doar când se utilizează produsul. Agitați bine înainte de a utiliza produsul pentru a obține o suspensie omogenă. Închideți corect sticla după utilizare. Notați data reconstituirii pe partea laterală a cutiei, în spațiul prevăzut.

Condiții de păstrare: A se depozita la temperatura camerei. Păstrați produsul închis în mod corespunzător și ferit de sursele de căldură. Odată ce produsul a fost reconstituit, acesta se va depozita în frigider pentru a-și îmbunătăți acțiunea probiotică. În orice caz, produsul nu trebuie utilizat mai mult de 14 zile după reconstituire.

Atenționări:

- Produsul se poate prezenta în două faze distincte. După agitare, acesta ar trebui să se prezinte sub formă de emulsie omogenă.

- Nu utilizați produsul după mai mult de 14 zile de la reconstituire.
 - După reconstituirea și agitarea produsului prezența eventuală a unor mase în suspensie nu afectează funcționalitatea și calitatea produsului.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 - A nu se depăși doza recomandată.
 - A nu se utiliza după data expirării; data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corespunzător.
 - A nu se utiliza dacă ambalajul nu este intact.
 - Toate componentele care alcătuiesc produsul, inclusiv picurătorul trebuie să fie intacte.
 - Nu utilizați plicul individual, ci doar pentru a reconstitui produsul.
 - După o scurtă perioadă de tratament (7 zile) fără rezultate semnificative, adresați-vă medicului.
 - În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și adresați-vă medicului pentru a stabili tratamentul adecvat.
 - Nu utilizați în caz de suspiciune de perforație intestinală sau ileus.
 - În timpul utilizării, dacă picurătorul este murdar, curățați-l în mod corespunzător înainte de a-l introduce în sticlă pentru a preveni o posibilă contaminare.
- Este important să vă informați medicul sau farmacistul cu privire la orice reacții adverse care nu sunt enumerate în acest prospect însoțitor.

Contraindicații: A nu se utiliza în caz de reacții de hipersensibilitate la componentele produsului.

Interacțiuni și incompatibilități

Nu există interacțiuni cunoscute sau raportate cu alte medicamente sau incompatibilități cu alte produse farmaceutice.

În cazul terapiei cu medicamente pe bază de Levotiroxină, consultați-vă medicul înainte de a utiliza produsul.

Sarcina și alăptarea

Sarcina: Nu există date adecvate privind utilizarea KEBENE Pro Baby la femeile însărcinate, așadar acesta nu trebuie utilizat decât în cazul unei necesități reale și după evaluarea de către medic.

Alăptarea: Nu se cunoaște dacă Simeticona se excretă în laptele matern, așadar nu trebuie utilizat decât în cazul unei necesități reale și după evaluarea de către medic.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehiculele și de a folosi utilajele.

Reacții adverse și supradozaj

De obicei Simeticona nu are efecte secundare când se administrează conform instrucțiunilor de pe ambalaj sau conform recomandării medicului dumneavoastră; în orice caz, unele persoane pot raporta reacții adverse mai puțin frecvente, precum:

- Greață; vărsături; diaree; durere abdominală și la nivelul ileonului

și cazuri rare de reacție alergică precum:

- Eruptions cutanate, faciale, edeme palpebrale și ale buzelor, umflarea gâtului cu dificultăți de respirație (angioedem)

În acest caz, consultați imediat medicul.

Nu s-au raportat reacții adverse în caz de supradozaj.

Data ultimei revizuirii: Decembrie 2017



LFSIS00801



Producător: NTC srl
Via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano, Italia

Distribuitor: Terapia SA
Str. Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca, România